fertivero

Plan. Grow. Sell.

2026

COMPANY CATALOGUE



Fertivero Pakistan
Lahore, Punjab

Crop nutrition · Crop protection
Agronomic intelligence

Plan.

We are building advanced, adaptive AI technology to help farmers plan their crops, monitor climate conditions and choose the right inputs for each field.

- **SCALE app**
- **FieldWise Adaptive AI**

Grow.

Our in-depth research and innovative products help farmers work towards high-quality crops and higher yields.

- **Crop Nutrition**
- **Crop Protection**
- **Biostimulants**

Sell.

A system we are building to connect farmers with the right markets, so they stay in control of their own produce.

- **HARVEST Marketplace**



2023
Acquisition
Rotopak D.o.o

2024
Founded
A year of building before a product carried the name.

26
Branded Products
Across six categories.

6
Patents in development
Insecticide, Fungicide, Herbicide, Bio Pesticides

3
Global Operating Countries
Denmark (headquarters) Serbia and Pakistan.

30
Distributor Markets
Europe, Asia, South America, North America, MENA (Middle East & Africa)

150+
Employees
Across our Danish, Serbian and Pakistani companies.

6
People in Global R&D
Paraguay, Australia, Indonesia, Colombia, Brazil, Argentina

4
University Partners
In China and Pakistan.

Why we are here.



MISSION

To connect every farmer to the science, technology and markets that reward their work.

VISION

Where every farmer can turn data into confidence, innovation into yield, and yield into a legacy.

PURPOSE

Unlock the potential held in every field and honour the people whose work brings it to life.

AMBITION

Higher performance, lighter footprint.

Precision is not a feature of our system. It is the environmental case for it. Advice aimed at the square metre that needs it means less waste, less exposure, and soil in better condition at the end of the season than at the start.

Our Portfolio

43 branded products across six categories.

Each category carries its own colour and letter code, on the label band, the cap and the bag — so the right product is easy to find on a shelf and in a store room.

11 Products

Insecticides

Options for sucking pests, caterpillars, borers and termites

7 Products

Fungicides

Options for rust, blight, blast, mildew and bacterial disease.

10 Products

Herbicides

Weed control vefore sowing, before emergence and during crop growth.

3 Products

PGRs

Plant growth regulators and biostimulants for colour development and stress recovery.

10 Products

Crop nutrition

Nutrients, soil conditioners and biostimulants for different crop needs.

2 Products

Seed care

Protection for seed and seedlings from the start of the season.

INSECTICIDES



Solvenra

Flonicamid 50% (WG)

CROP	PROBLEM	DOSE
Cotton	Whitefly, jassid, aphid, thrips	60–80 g/acre
Wheat	Aphid	60–80 g/acre
Potato	Aphid, jassid, whitefly	60 g/acre
Vegetables (okra, chilli, cucurbits)	Aphid, jassid, whitefly	60 g/acre
Rice	Planthopper	60 g/acre

سولوینرا سست تیلے، سفید مکھی اور سبز تیلے کا رس چوسنا جلد روک دیتی ہے۔
کپاس، گندم، آلو اور سبزیوں کے لیے، اور مزاحمت کے انتظام میں مددگار

Zyta

Fipronil 5% (SC)

CROP	PROBLEM	DOSE
Rice	Stem borer, leaf folder, planthopper	480 ml/acre
Sugarcane	Termite, early shoot borer	1 - 2 l/acre
Maize	Termite, cutworm	1 - 2 l/acre
Wheat	Termite	1 - 2 l/acre



زائیٹا دھان کی تنے کی سنڈی، پتا لپیٹ سنڈی اور تیلے کے خلاف استعمال ہوتی
ہے، اور گنے، مکئی اور گندم میں دیمک کے لیے آبپاشی کے ساتھ دی جاتی ہے۔



Mactō Zen+

Emamectin Benzoate 5% (WG)

CROP	PROBLEM	DOSE
Cotton	American bollworm, pink bollworm, armyworm	75–100 g/acre
Maize	Fall armyworm	75–100 g/acre
Cabbage / cauliflower	Diamondback moth	60–75 g/acre
Tomato / chilli / okra	Fruit borer	75 g/acre

میکٹو زین پلس زیادہ طاقت (5 فیصد) والی دانے دار شکل ہے جو کپاس، مکئی
اور سبزیوں کی سنڈیوں کے خلاف چھوٹے پیک میں پوری مقدار دیتی ہے۔



Revent

Chlorantraniliprole 9% + Emamectin Benzoate 2.6% (SC)

CROP	PROBLEM	DOSE
Maize	Fall armyworm, maize stem borer	100 ml/acre
Rice	Leaf folder, stem borer	100 ml/acre
Sugarcane	Top, stem and root borers	100 ml/acre
Cotton	American, pink and spotted bollworms	100 ml/acre
Tomato / brinjal / okra	Fruit and shoot borer	100 ml/acre

ریوینٹ دو طاقتور اجزاء کے ساتھ مکئی کے فال آرمی ورم، دھان اور گنے کی سنڈیوں اور کپاس کی سنڈیوں کو قابو کرتی ہے۔ ایک پیک ایک ایکڑ کے لیے۔

Sonat

Chlorantraniliprole 0.4% + Clothianidin 1.2% (GR)

CROP	PROBLEM	DOSE
Rice	Top, stem and root borers; termite	6 kg/acre
Sugarcane	Stem borer, leaf folder	6 kg/acre
Maize	Maize stem borer	6 kg/acre

سوناٹ دانے دار دوا ہے جو گنے، دھان اور مکئی میں تنے کی سنڈی اور دیمک کے خلاف ڈالی جاتی ہے۔ بکھیر کر پانی لگائیں





Baxto

Emamectin 1% + Lufenuron 2% (SC)

CROP	PROBLEM	DOSE
Cotton	Armyworm, American and spotted bollworms	400 ml/acre
Maize	Fall armyworm	400 ml/acre
Cabbage / cauliflower / tomato	Diamondback moth, armyworm, fruit borer	400 ml/acre
Gram (chickpea)	Pod borer	400 ml/acre
Berseem / sugar beet	Armyworm (beet armyworm)	400 ml/acre

بیکسٹو انڈے اور سنڈی دونوں پر اثر کرتی ہے۔ کپاس، مکئی، سبزیوں اور برسیم میں لشکری سنڈی اور امریکی سنڈی کے لیے۔



Siphex

Spinosad **2.5%** + Chlorfenapyr **10.5%** (SC)

CROP	PROBLEM	DOSE
Cotton	Thrips, armyworm, bollworm	100 - 150 ml/acre
Chilli	Thrips, leafminer	100 - 150 ml/acre
Onion	Thrips	100 - 150 ml/acre
Maize	Fall armyworm	150 ml/acre
Citrus / orchards	Thrips, leafminer	2 ml per 1 L water

سائفیکس مرچ، پیاز اور کپاس میں تھرپس اور جوؤں کے ساتھ لشکری سنڈی کو بھی قابو کرتی ہے۔ دو مختلف طریقوں سے کام کرتی ہے۔

Pynova

Pymetrozine **60%** +
Nitenpyram **20%** (WG)

CROP	PROBLEM	DOSE
Rice	Brown & white-backed planthopper	100 g/acre
Cotton	Whitefly, jassid, aphid	100 g/acre
Vegetables (okra, cucurbits, chilli)	Aphid, jassid	100 g/acre

پائینووا دو اجزاء والی دوا ہے جو دھان کے بھورے تیلے اور کپاس کی سفید مکھی و سبز تیلے کو قابو کرتی ہے۔ کیڑا فوراً رس چوسنا چھوڑ دیتا ہے۔





Lamthra

Lambda-cyhalothrin **3.5%**
+ Thiamethoxam **11.6%** (SC)

CROP	PROBLEM	DOSE
Cotton	Jassid, bollworms	160 ml/acre
Wheat	Aphid	100–120 ml/acre
Maize	Aphid, early fall armyworm, shoot fly	120–160 ml/acre
Okra / brinjal	Jassid, whitefly, fruit borer	120–160 ml/acre

لیمتھرافوری اثر اور سسٹمک تحفظ کو ملا کر کپاس کی سفید مکھی، سبز تیلے، تھرپس اور سنڈیوں کو ایک ہی سپرے میں قابو کرتی ہے۔



Diafora

Diafenthiuron **80%** (WG)

CROP	PROBLEM	DOSE
Cotton	Whitefly, mites, jassid	125 g/acre
Vegetables (brinjal, chilli, okra)	Whitefly, mites	125 g/acre

ڈائیفورا کپاس اور سبزیوں میں سفید مکھی اور جوؤں (مائٹس) کو کنٹرول کرتی ہے۔ دھوپ والے دن سپرے کریں۔

Spirona

Dinotefuran **7%** + Spirotetramat **10%** (WG)

CROP	PROBLEM	DOSE
Cotton	Whitefly (adults, nymphs), mealybug	250–300 g/acre
Vegetables (brinjal, chilli, tomato, okra)	Whitefly, aphid	250 g/acre
Citrus	Mealybug, whitefly, citrus psylla	50 g per 100 litres of water

اسپیرونا کپاس اور سبزیوں میں سفید مکھی کے بالغ اور بچوں، اور گدھیڑی کو کنٹرول کرتی ہے۔ پودے میں اوپر نیچے سفر کرتی ہے۔ (ملی بگ)



FUNGICIDES



Azurix

Chlorothalonil 50% + Azoxystrobin 6% (SC)

CROP	PROBLEM	DOSE
Potato / Tomato	Late blight, early blight, downy mildew	250 - 500 ml/acre
Rice	Rice blight, blast	250 - 500 ml/acre
Onion	Purple blotch, downy mildew	250 - 500 ml/acre
Wheat	Yellow (stripe) rust, brown (leaf) rust, powdery mildew	250 - 500 ml/acre
Cucurbits	Downy mildew, Anthracnose / fruit rot, leaf spot	250 - 500 ml/acre

ازوریکس آلو اور ٹماٹر کے جھلساؤ، پیاز اور کدو کی روئیں دار پھپھوندی کے خلاف حفاظتی اور اندرونی دونوں طرح کام کرتی ہے۔

Blitvero

Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% (WP)

CROP	PROBLEM	DOSE
Potato	Late blight (Phytophthora infestans); early blight	500–750 g/acre
Tomato	Late blight, early blight	500 g/acre
Cucurbits / grapes	Downy mildew	500 g/acre

بلٹ ویرو آلو اور ٹماٹر میں پچھیتی جھلساؤ (لیٹ بلائٹ) کو روکتی اور شروع ہونے والی بیماری کو ختم کرتی ہے۔ دھند کے موسم سے پہلے سپرے شروع کریں۔





Sulfvero

Sulfur 80% (WG)

CROP	PROBLEM	DOSE
Wheat / rice / cotton (soil)	Sulphur nutrition; soil pH correction in alkaline soils and fungal diseases	1–2 kg/acre
Vegetables	Sulphur nutrition; soil pH correction in alkaline soils and fungal diseases	1–2 kg/acre
Potato	Sulphur nutrition; soil pH correction in alkaline soils and fungal diseases	1–2 kg/acre
Citrus / orchards	Sulphur nutrition; soil pH correction in alkaline soils and fungal diseases	250 g per 100 L water

سلف ویرو سفوفی پھپھوندی اور جوؤں کو قابو کرتی ہے اور فصل کو سلفر بھی دیتی ہے۔ 32 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت میں سپرے نہ کریں۔



Difazo

Difenoconazole **12.5%** + Azoxystrobin **20%** (SC)

CROP	PROBLEM	DOSE
Wheat	Yellow (stripe) rust, brown (leaf) rust, powdery mildew	200 ml/acre
Rice	Sheath blight, blast, brown leaf spot	200 ml/acre
Potato	Early blight	200 ml/acre
Tomato / chilli	Early blight, leaf spot, powdery mildew	200 ml/acre
Mango	Anthracnose, powdery mildew	50 ml per 100 L water

،ڈیفازو گندم کی زرد اور بھوری کنگی اور سفوفی پھپھوندی کے ساتھ دھان
آلو اور سبزیوں کی بیماریوں کو قابو کرتی ہے۔

Rustova

Pyraclostrobin **8%** + Tebuconazole **37%** (WP)

CROP	PROBLEM	DOSE
Wheat	Yellow (stripe) rust, brown (leaf) rust, powdery mildew	150–200 g/acre
Rice	Sheath blight, brown leaf spot, false smut	200 g/acre
Mango	Powdery mildew, anthracnose	1 g per litre of water

رسٹووا گندم میں پیلی اور بھوری کنگی، اور دھان میں تنے کے جھلساؤ کو
روکتی ہے۔ پتے سبز رکھتی اور دانہ بھرنے میں مدد دیتی ہے۔





Fnjiko

Metiram **55%** + Pyraclostrobin **5%** (WG)

CROP	PROBLEM	DOSE
Potato	Early blight, late blight	600 g/acre
Tomato	Early blight, late blight	600 g/acre
Onion	Downy mildew	250 g/acre
Cucumber / melon	Powdery and downy mildew	400 g/acre
Citrus	Gummosis, withertip	250–300 g per 100 L water

فنجیکو آلو اور ٹماٹر کے اگیتے اور پچھیتے جھلساؤ اور سبزیوں کی پھپھوندی
کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔

Bakter

Copper 45% + Kasugamycin 2% (WP)

CROP	PROBLEM	DOSE
Rice	Bacterial leaf blight, blast	250–400 g/acre
Citrus	Citrus canker, scab	200–250 g per 100 L water
Tomato / chilli	Bacterial spot, leaf spot	250–400 g/acre
Garlic / onion	Leaf blight, purple blotch	250–400 g/acre
Potato	Early blight, bacterial soft rot (suppression)	250–400 g/acre

بیکٹر بیکٹیریا اور پھپھوندی دونوں بیماریوں کے خلاف کام کرتی ہے۔ دھان کے پتوں کا جھلساؤ، ترشاوہ پھلوں کا کینکر اور سبزیوں کے دھبے۔



HERBICIDES



Herdion 96

S-Metolachlor 96% (EC)

CROP	PROBLEM	DOSE
Cotton	Annual grasses (itsit, swanki), small-seeded broadleaves	800 ml/acre
Maize	Annual grasses, small-seeded broadleaves	800 ml/acre
Sugarcane	Annual grasses, small-seeded broadleaves	800 ml/acre
Potato / onion / chilli	Annual grasses, small-seeded broadleaves	600–800 ml/acre
Soybean / mungbean	Annual grasses, small-seeded broadleaves	600–800 ml/acre

ہرڈیون 96 بوائی کے فوراً بعد نمدار زمین پر سپرے کی جاتی ہے تاکہ گھاس اور چھوٹے بیج والی جڑی بوٹیاں اُگ ہی نہ سکیں۔

Lectiva

Quizalofop-p-ethyl 15% (EC)

CROP	PROBLEM	DOSE
Cotton	Grass weeds (swanki, madhana, baru seedlings)	250–500 ml/acre
Soybean / mungbean / groundnut	Grass weeds	250–500 ml/acre
Potato	Grass weeds	250–500 ml/acre

لیکٹیوا کپاس، دالوں اور سبزیوں میں گھاس کو ختم کرتی ہے۔





Kastra

Mesosulfuron-methyl 0.9% + Florasulam 0.6% + MCPA 23.5% (OD)

CROP	PROBLEM	DOSE
Wheat	Wild oat (jangli jai), Phalaris minor (dumbi sitti), bathu, lehli, jangli palak, maina, krund	360–400 ml/acre

کاسٹرا گندم میں دمبی سٹی، جنگلی جئی اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کو ایک ہی سپرے میں ختم کرتی ہے



Rediko

Atrazine 50% + Mesotrione 5% (SC)

CROP	PROBLEM	DOSE
Maize	Broadleaves (itsit, jangli chaulai, madhana), some grasses and sedges	1 l/acre
Sugarcane	Broadleaves, annual grasses, sedges	1 - 2 l/acre

ریڈیکو مکئی اور گنے میں چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں، گھاس اور ڈیلا کو قاب کرتی ہے۔

Topriva

Topramezone 30% (SC)

CROP	PROBLEM	DOSE
Maize	Broadleaves and grasses (itsit, madhana, swanki, jangli chaulai)	35 ml/acre
Sugarcane	Broadleaves and grasses	35–40 ml/acre

ٹوپریوا مکئی اور گنے میں اُگنے کے بعد جڑی بوٹیوں کو ختم کرتی ہے۔
صرف 35 ملی لیٹر فی ایکڑ، ساتھ چپکنے والا محلول ملائیں۔





Lector

Glyphosate 48% (SL)

CROP	PROBLEM	DOSE
Fallow land / field bunds / non-crop	Annual and perennial grasses and broadleaves (incl. baru, dab)	1–2 L/acre
Zero-till wheat after rice	Weeds and rice regrowth before sowing	1 L/acre
Citrus / mango orchards	Inter-row weeds	1–1.5 L/acre

لیکٹر خالی زمین، کھالوں اور باغات کی قطاروں میں ہر قسم کی جڑی بوٹیوں کو جڑ سے ختم کرتی ہے۔ فصل پر نہ پڑنے دیں۔

Rizvero

Bispyribac-sodium **18%** +
Bensulfuron-methyl **12%** (WP)



CROP	PROBLEM	DOSE
Rice (transplanted)	Barnyard grass (swanki), sedges (deela), broadleaf weeds	100 g/acre
Rice (direct-seeded)	Grass, sedge and broadleaf weeds	100 g/acre

رزویرو دھان میں سوانکی گھاس، ڈیلا اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کو ایک ہی سپرے میں ختم کرتی ہے۔ سپرے سے پہلے کھیت سے پانی نکال دیں۔

Zyron 40

Bromoxynil **20%** + MCPA **20%** (EC)

CROP	PROBLEM	DOSE
Wheat	Broadleaves: bathu, lehli, jangli palak, maina, krund, shahtra	500 ml/acre



زائرون 40 گندم میں باتھو، لیہلی، جنگلی پالک اور دوسری چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کو ختم کرتی ہے۔

PhaleX

Clodinafop-propargyl **15%** (WP)



CROP	PROBLEM	DOSE
Wheat	Phalaris minor (dumbi sitti), wild oat, other grass weeds	120 g/acre


فیلیکس گندم میں دمبی سٹی اور جنگلی جئی کو ختم کرنے والی زہر ہے۔ پہلے پانی کے بعد، بوائی کے 30 سے 40 دن میں سپرے کریں

Protega

Cyhalofop-butyl 15% + Metamifop 10% (OD)

CROP	PROBLEM	DOSE
Rice (transplanted & direct-seeded)	Swanki / dhiddan (Echinochloa), ghora ghaas (Leptochloa), other grasses	400 ml/acre

پروٹیگا دھان میں سوانکی اور گھوڑا گھاس کو ختم کرتی ہے۔ سپرے سے پہلے پانی نکالیں اور ایک دو دن بعد دوبارہ لگائیں۔



PGRs



Growvero

Amino Acid Hydrolysate **10%** (SL)

CROP	PROBLEM	DOSE
Wheat / rice / maize	Growth and stress recovery (heat, cold, herbicide stress)	500 ml/acre
Cotton	Vegetative growth, flower and boll retention	500 ml/acre
Vegetables / potato	Vegetative growth, fruit set	500 ml/acre
Citrus / mango	Flowering, fruit set	250 ml per 100 L water

گرو ویرو امینو ایسڈ پر مبنی ٹانک ہے جو فصل کی بڑھوتری اور گرمی، سردی یا دباؤ کے بعد بحالی میں مدد دیتا ہے۔

Colvero

S-Abscisic Acid (S-ABA) **5%** (SL)

CROP	PROBLEM	DOSE
Grapes (red/black varieties)	Uneven berry colour	2–4 g per litre of water
Apple	Poor red colour	1–2 g per litre of water
Mango	Poor red blush and uneven fruit colour	100–200 mg/L S-ABA (2–4 g product per litre)
Citrus (kinnow, oranges)	Slow or uneven peel colour at maturity	100–200 mg/L S-ABA (2–4 g product per litre)
Vegetables (tomato, chilli)	Transplant shock, heat and drought stress	10–20 mg/L S-ABA (0.2–0.4 g product per litre)



کول ویرو آم، کینو، مالٹے، انگور اور سیب میں قدرتی رنگ بہتر بناتا ہے، اور ٹماٹر اور مرچ کو منتقلی، گرمی اور خشکی کے دباؤ سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔




Florvero

Paclobutrazol **25%** (SC)

CROP	PROBLEM	DOSE
Mango	Irregular or poor flowering, alternate bearing, excess vegetative growth	About 3 ml product per metre of canopy diameter per tree (e.g. 15–20 ml for a 5–6 m tree)

فلورویرو آم کے درخت پر جلدی، زیادہ اور ہر سال باقاعدہ بور (پھول) لانے میں مدد دیتی ہے۔ ستمبر یا اکتوبر میں تنے کے گرد زمین میں ڈالیں۔

CROP NUTRITION



Borvero

Boron **20%** (disodium octaborate tetrahydrate) (WSP)



CROP	PROBLEM	DOSE
Cotton	Boron deficiency: square and boll shedding, poor boll set	250–500 g/acre
Wheat	Boron deficiency: poor grain set and empty spikelets	250 g/acre
Citrus / mango	Boron deficiency: flower and fruit drop, cracking	1–1.5 g per litre of water
Potato / vegetables	Boron deficiency: hollow heart, poor tuber and fruit quality	250 g/acre

بوروِیرو بوران کی کمی پوری کرتی ہے۔ کپاس میں ٹینڈے اور پھول گرنے سے بچاتی گندم میں دانہ بھرنے اور ترشاوہ و آم میں پھل جھڑنے کو کم کرتی ہے۔

Lipure

Ammonium Polyphosphate (APP)
NP **18-58-0**(WSG)



CROP	PROBLEM	DOSE
Rice	Yellow (stripe) rust, brown (leaf) rust, powdery mildew	150–200 g/acre
Mango	Sheath blight, brown leaf spot, false smut	200 g/acre
Wheat	Powdery mildew, anthracnose	1 g per litre of water

لائی پیور پولی فاسفیٹ کھاد ہے جو فاسفورس کو زمین میں زیادہ دیر تک دستیاب رکھتی ہے۔

Klosed SOP

Sulphate of Potash (SOP) **50%** K2O + **18%** S, chloride-free (WSG)



CROP	PROBLEM	DOSE
Potato	Tuber bulking, quality	2 kg/acre
Potato / vegetables (fertigation)	Potassium and sulphur supply	5–10 kg/acre
Wheat	Grain filling	2 kg/acre
Cotton	Boll development	2 kg/acre
Citrus / mango	Fruit size and colour	1 kg per 100 L water
Tobacco	Leaf quality (chloride-free K)	2 kg/acre

کلوزڈ ایس او پی کلورائیڈ سے پاک پوٹاش اور سلفر ہے۔ آلو کے سائز، پھل کی کوالٹی اور دانے کی بھرائی کے لیے۔

Tetraniv

Humic + Fulvic combination (WSL)



CROP	PROBLEM	DOSE
Wheat / rice / maize	Root growth, nutrient uptake	4 L/acre
Cotton	Root growth, nutrient uptake	4 L/acre
Sugarcane	Root growth, tillering	4 - 8 L/acre
Potato / vegetables	Root growth, nutrient uptake	4 L/acre
Orchards	Root activity	2–4 L/acre

ٹیٹرانیو ہیومک اور فلوک ایسڈ ہے جو جڑوں کو مضبوط بناتا ہے اور کھاد کے بہتر استعمال میں مدد دیتا ہے۔

TetranivSG

Seaweed + organic matter + NPK + chelated micronutrient compound (WSG)



CROP	PROBLEM	DOSE
Wheat / rice / maize	Soil conditioning, balanced early nutrition	10 kg/acre
Potato / vegetables	Soil conditioning, root growth	10 kg/acre
Sugarcane	Soil conditioning, root growth	10 kg/acre
Orchards	Soil conditioning	250–500 g per tree

ٹیٹرانیو ایس جی سمندری گھاس، نامیاتی مادہ، این پی کے اور اجزائے صغیرہ کا مرکب ہے جو زمین کی صحت اور جڑوں کی بڑھوتری بہتر بناتا ہے۔

Znvero

Zinc Sulphate (Monohydrate **33%** (WSG)



CROP	PROBLEM	DOSE
Rice	Zinc deficiency	3–6 kg/acre
Wheat	Zinc deficiency	3 kg/acre
Maize	Zinc deficiency	3 kg/acre
Cotton / vegetables	Zinc deficiency	3–6 kg/acre
Citrus / mango	Zinc deficiency (little leaf, mottling)	50–100 g per plant

زن ویرو 33 فیصد زنک سلفیٹ ہے جو دھان کے کھیرا اور گندم، مکئی اور کپاس میں زنک کی کمی دور کرتا ہے۔



Klosed MAP

Mono-Ammonium Phosphate (MAP) 12-61-0 water-soluble (WSG)

CROP	PROBLEM	DOSE
Vegetables / potato (fertigation)	Early root and shoot growth	5–10 kg/acre
Wheat	Tillering, root growth	5–10 kg/acre
Cotton	Early growth, flowering	5–10 kg/acre
Citrus / mango	Root flush, flowering	1 kg per 100 L water

کلوزڈ میپ (12-61-0) جڑوں کی ابتدائی بڑھوتری اور پھول کے لیے فاسفورس دیتا ہے۔

Mgvero

Magnesium Sulphate (Epsom) **9.6%** Mg (WSG)

CROP	PROBLEM	DOSE
Potato	Magnesium deficiency (interveinal yellowing)	1 kg/acre
Cotton	Leaf reddening (Mg deficiency)	1–2 kg/acre
Citrus / Grapes	Magnesium deficiency	1–2 kg per 100 L water
Tomato / Chilli	Magnesium deficiency	1 kg/acre

ایم جی ویرو میگنیشیم سلفیٹ ہے جو پتوں کی زردی اور کپاس میں پتوں کی سرخی (میگنیشیم کی کمی) دور کرتا ہے





Znveroplus

Zn-EDTA Chelate **6%** (WSG)

CROP	PROBLEM	DOSE
Rice / wheat / maize	Zinc deficiency	500 g/acre
Cotton	Zinc deficiency	500 g/acre
Vegetables	Zinc deficiency	500 g/acre
Citrus / mango	Zinc deficiency	50 g per 100 L water

زن ویرو پلس کیلیٹڈ زنک ہے جو پتوں پر سپرے سے زنک کی کمی جلد دور کرتا ہے۔

Bivero

CROP	PROBLEM	DOSE
Cotton	Flower and boll retention	500 ml/acre
Tomato / chilli	Flowering, fruit set	200–250 ml/acre
Rice / wheat	Tillering, stress recovery	200–250 ml/acre
Fruit trees	Flowering, fruit set	20–30 ml per 100 L water

Phenols and nitro compounds



BIOSTIMULANT

SEED TREATMENT

Kloseed

Clothianidin **25%** + Metalaxyl-M 0.3% +
Fludioxonil **0.7%** (FS)

CROP	PROBLEM	DOSE
Maize (hybrid)	Termite, shoot fly, aphid; seedling rots	8 g per kg seed
Cotton (delinted)	Jassid, whitefly, thrips (early season); seedling rots	10–13 g per kg seed
Wheat	Termite, aphid; seed-borne diseases	1.5–2 g per kg seed

کلوسیڈ بیج کو دیمک، رس چوسنے والے کیڑوں اور بیج کے گلنے سے بچانے کے لیے بوائی سے پہلے لگایا جاتا ہے۔





Trigerm

Metalaxyl-M **3%** + Fludioxonil 2% +
Thiamethoxam **15%**(FC)

CROP	PROBLEM	DOSE
Maize (hybrid)	Seed and seedling rots (Pythium, Fusarium, Rhizoctonia); shoot fly, aphid, termite	2.5–5 ml per kg seed
Cotton (delinted)	Seedling rots; jassid, whitefly, thrips (early season)	2.5–5 ml per kg seed
Wheat	Seed-borne and soil-borne diseases; aphid, termite	2.5–5 ml per kg seed
Okra / vegetables	Damping-off; early sucking pests	2.5–5 ml per kg seed

ٹرائی جرم بیج کو بوائی سے پہلے لگایا جاتا ہے تاکہ اُگاؤ کے وقت پھپھوندی کی بیماریوں اور ابتدائی رس چوسنے والے کیڑوں سے تحفظ ملے۔

fertivero

Plan . Grow . Sell



Fertivero d.o.o. · registered in Čačak, Serbia · Reg. No. 22318438 · Headquarters: Copenhagen, Denmark
www.fertivero.com · info@fertivero.com · Company Profile 2026, first edition